

<https://reseauinternational.net/les-vaccins-anti-covid-quarante-fois-plus-dangereux-que-les-vaccins-anti-grippaux/>

## Les vaccins anti-covid quarante fois plus dangereux que les vaccins anti-grippaux ?



16 mars 2021

**par Patrice Gibertie.**

**Et si on comparait les effets secondaires des vaccins contre la grippe à ceux contre la Covid.**

Après avoir été insulté par des « sachants » parce que je défendais le droit des soignants à ne pas être vaccinés obligatoirement, je voudrais répondre par des faits précis portant sur les effets secondaires relevés en Europe par Eudravigilance. Ces effets ne sont pas obligatoirement provoqués par le vaccin mais ils suivent le vaccin de quelques heures ou jours.

Tous ceux qui meurent ne meurent pas du vaccin mais avec le vaccin.

Trois substances sont utilisées pour vacciner contre la grippe les habitants de l'espace économique européen (dont les 65 millions de plus de 65 ans vaccinés à plus de 50%).

Au 13 mars on peut estimer que le nombre de vaccinés annuels covid et grippe est à peu près le mêmes.

À cette date plus de 180 000 vaccinés covid ont subi des effets secondaires contre plus de 30 000 pour la grippe en totalisant toutes les données depuis dix ans, soit 40 à 60 fois plus d'effets secondaires annuels.

Pour les décès je comparerai le nombre de décès qui suivent une vaccination pour une seule cause, la plus large, le désordre général. Je ne totalise donc pas tous les décès rapportés ;


**Pour cette seule cause on comptabilise pour les trois vaccins covid : 1 488 en un an**

- AstraZeneca 198
  - Pfizer 957
  - Moderna 393
- 1 488 décès de personnes différentes (pas de confusion possible)**
- Pour les vaccins grippe 413 depuis le début de la remontée des infos (dix ans environ) Y COMPRIS LA SALOPERIE PROMUE PAR ROZELYNE

Les vaccins à virus inactivés comme celui de la grippe ou hépatite ont des effets et complications secondaires moindres. D’ailleurs ils existent contre le Coronavirus en Inde et en Chine. Un laboratoire nantais Valvena malheureusement acheté par l’Angleterre en fabrique un aussi.

**Soit une quarantaine par an**

- LEA 5
- SPI 268
- SAI 140






Choisissez un groupe de réaction, puis une réaction suspectée signalée pour voir le nombre de cas individuels identifiés dans EudraVigilance pour **TOZINAMERAN** (jusqu'au 13/03/2021)

**pfizer en trois mois de signalements**

Groupes de réaction et réaction suspectée signalée

- Groupes de réaction
- Réaction suspectée signalée
- Abcès stérile
  - Echymose au site d'administration
  - Décoloration au site d'administration
  - Dysesthésie au site d'administration
  - Erythème au site d'administration
  - Hypersensibilité au site d'administration
  - Induration du site d'administration
  - Inflammation au site d'administration
  - Irritation au site d'administration
  - Erythème articulaire au site d'administration
  - Altération des mouvements articulaires au site d'administration
  - Douleurs articulaires au site d'administration
  - Chaleur articulaire du site d'administration
  - Lymphadénopathie au site d'administration
  - Altération des mouvements du site d'administration
  - Nodule du site d'administration
  - Œdème au site d'administration
  - Douleur au site d'administration
  - Paresthésie au site d'administration
  - Prurit au site d'administration
  - Éruption cutanée au site d'administration
  - Réaction au site d'administration
  - Gonflement du site d'administration
  - Chaleur du site d'administration
  - Plaie au site d'administration
  - Réaction indésirable au médicament
  - Interaction alcoolique
  - Mort apparente
  - Froid du site d'application
  - Erythème au site d'application
  - Hémorragie au site d'application
  - Hyposthésie au site d'application
  - Insuration du site d'application
  - Inflammation articulaire au site d'application
  - Altération des mouvements articulaires au site d'application
  - Gonflement des articulations au site d'application
  - Chaleur des articulations au site d'application
  - Lymphadénopathie au site d'application
  - Masse du site d'application
  - Altération des mouvements du site d'application
  - Nodule du site d'application
  - Œdème au site d'application
  - Douleur au site d'application
  - Papules de site d'application
  - Paresthésie au site d'application
  - Prurit au site d'application
  - Réaction au site d'application

Nombre de cas individuels par groupe d'âge et sexe, groupe de rapporteurs et résultat



Pour l'interprétation des résultats, veuillez vous référer aux considérations clés sur [www.adrreports.eu](http://www.adrreports.eu)




Choisissez un groupe de réaction, puis une réaction suspectée signalée pour voir le nombre de cas individuels identifiés dans EudraVigilance for **COVID-19 VACCINE ASTRAZENCA (CHADOX1 NCOV-19)** (Jusqu'au 13/03/2021)

**en moins de trois mois de signalement**

Groupes de réaction et réaction suspectée signalée

- Groupes de réaction
- Réaction suspectée signalée
- Echymose au site d'administration
  - Œdème au site d'administration
  - Douleur au site d'administration
  - Réaction indésirable au médicament
  - Événement indésirable
  - Réaction indésirable
  - Echymose au site d'application
  - Froid du site d'application
  - Erythème au site d'application
  - Hyposthésie au site d'application
  - Douleurs articulaires au site d'application
  - Chaleur des articulations au site d'application
  - Œdème au site d'application
  - Douleur au site d'application
  - Prurit au site d'application
  - Réaction au site d'application
  - Gonflement du site d'application
  - Asthénie
  - Douleur axillaire
  - Mort cérébrale
  - Inconfort thoracique
  - Douleur de poitrine
  - Des frissons
  - Syndrome de fatigue chronique
  - Maladie concomitante aggravée
  - Condition aggravée
  - Pleurs
  - Mort
  - Diminution de la vitesse de marche
  - Échec du régime
  - Décharge
  - Malaise
  - Récidive de la maladie
  - Effet du médicament moins que prévu
  - Médicament inefficace
  - Interaction médicamenteuse
  - Intolérance aux médicaments
  - Syndrome de sevrage médicamenteux
  - Énergie augmentée
  - La tolérance à l'exercice a diminué
  - Gonflement important du membre vacciné
  - Œdème du visage
  - Inconfort facial
  - Douleur faciale
  - Fatigue
  - Se sentir anormal
  - Avoir froid

Nombre de cas individuels par groupe d'âge et sexe, groupe de rapporteurs et résultat



Pour l'interprétation des résultats, veuillez vous référer aux considérations clés sur [www.adrreports.eu](http://www.adrreports.eu)

Choisissez un groupe de réaction, puis une réaction suspectée signalée pour voir le nombre de cas individuels identifiés dans EudraVigilance for **INFLUENZA VACCINE (SURFACE ANTIGEN, INACTIVATED)** (Jusqu'au 13/03/2021)

Groupes de réaction et réaction suspectée signalée

Groupes de réaction




General disorders and administration site conditions

Réaction suspectée signalée

- Echymose au site d'administration
- Erythème au site d'administration
- Hématome au site d'administration
- Induration du site d'administration
- Altération des mouvements articulaires au site d'administration
- Altération des mouvements du site d'administration
- Cedème au site d'administration
- Douleur au site d'administration
- Réaction au site d'administration
- Gonflement du site d'administration
- Chaleur du site d'administration
- Réaction indésirable au médicament
- Événement indésirable
- Réaction indésirable
- Interaction alcoolique
- Erythème au site d'application
- Hématome au site d'application
- Hyperesthésie au site d'application
- Hypoesthésie au site d'application
- Altération des mouvements articulaires au site d'application
- Cedème au site d'application
- Douleur au site d'application
- Prurit au site d'application
- Eruption cutanée au site d'application
- Réaction au site d'application
- Gonflement du site d'application
- Asthénie
- Atrophie
- Douleur axillaire
- Mort cérébrale
- La calcinose
- Mort cardiaque
- Inconfort thoracique
- Douleur de poitrine
- Des frissons
- Syndrôme de fatigue chronique
- Maladie concomitante aggravée
- Progression concomitante de la maladie
- Condition aggravée
- Pleur
- Kyste
- Rupture de kyste
- Mort
- Diminution de l'activité
- Retard de développement
- Décharge
- Malaise
- Mal de la parole

Nombre de cas individuels par groupe d'âge et sexe, groupe de rapporteurs et résultat

**au cours des dix dernières années totalisées**



Pour l'interprétation des résultats, veuillez vous référer aux considérations clés sur [www.adrreports.eu](http://www.adrreports.eu)

Nombre de cas individuels / Nombre de cas individuels reçus au fil du temps / Nombre de cas individuels par pays de l'EEE / Nombre de cas individuels par groupes de réaction / Nombre de cas individuels pour un groupe de réaction sé

Choisissez un groupe de réaction, puis une réaction suspectée signalée pour voir le nombre de cas individuels identifiés dans EudraVigilance for **INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION, INACTIVATED)** (Jusqu'au 13/03/2021)

**au cours des dix dernières années totalisées**

Groupes de réaction et réaction suspectée signalée




Groupes de réaction

General disorders and administration site conditions

Réaction suspectée signalée

- Abcès stérile
- Echymose au site d'administration
- Erythème au site d'administration
- Hématome au site d'administration
- Induration du site d'administration
- Inflammation au site d'administration
- Irritation au site d'administration
- Erythème articulaire au site d'administration
- Altération des mouvements articulaires au site d'administration
- Altération des mouvements du site d'administration
- Cedème au site d'administration
- Douleur au site d'administration
- Prurit au site d'administration
- Eruption cutanée au site d'administration
- Réaction au site d'administration
- Gonflement du site d'administration
- Chaleur du site d'administration
- Réaction indésirable au médicament
- Événement indésirable
- Réaction indésirable
- Echymose au site d'application
- Dermatite au site d'application
- Décoloration au site d'application
- Erythème au site d'application
- Hématome au site d'application
- Hémorragie au site d'application
- Hyperesthésie au site d'application
- Hypoesthésie au site d'application
- Induration du site d'application
- Altération des mouvements articulaires au site d'application
- Altération des mouvements du site d'application
- Cedème au site d'application
- Douleur au site d'application
- Papules de site d'application
- Prurit au site d'application
- Réaction au site d'application
- Gonflement du site d'application
- Vésicules du site d'application
- Asthénie
- Atrophie
- Douleur axillaire
- Mort cérébrale
- La calcinose
- Mort cardiaque
- Inconfort thoracique
- Douleur de poitrine
- Des frissons
- Syndrôme de fatigue chronique

Nombre de cas individuels par groupe d'âge et sexe, groupe de rapporteurs et résultat






Pour l'interprétation des résultats, veuillez vous référer aux considérations clés sur [www.adrreports.eu](http://www.adrreports.eu)

Choisissez un groupe de réaction, puis une réaction suspectée signalée pour voir le nombre de cas individuels identifiés dans EudraVigilance for **INFLUENZA VACCINE (SURFACE ANTIGEN, INACTIVATED)** (jusqu'au 13/03/2021) **au cours des dix dernières années totalisées**

- Groupes de réaction et réaction suspectée signalée**
- Groupes de réaction  
 Blood and lymphatic system disorders
- Réaction suspectée signalée
- Lymphadénopathie abdominale
  - Hémophilie acquise
  - Agranulocytose
  - Anémie
  - Anémie aplasique
  - Anémie hémolytique auto-immune
  - Maladie du sang
  - Insuffisance de la moelle osseuse
  - Coagulopathie
  - Anémie hémolytique de type froid
  - Anémie hémolytique positive de Coombs
  - Coagulation intravasculaire disséminée
  - Eosinophilie
  - Syndrome d'Evans
  - Aplasie fébrile de la moelle osseuse
  - Granulocytopénie
  - Hémolyse
  - Anémie hémolytique
  - Diathèse hémorragique
  - Anémie hypochrome
  - Thrombocytopénie immunitaire
  - Augmentation de la tendance aux bleus
  - Réaction leucémoïde
  - Leucocytose
  - Leucopénie
  - Douleur ganglionnaire
  - Lymphadénite
  - Lymphadénopathie
  - Lymphocytose
  - Hyperplasie des tissus lymphoïdes
  - Lymphopénie
  - Macrocytose
  - Monocytose
  - Neutropénie
  - Neutrophilie
  - Anémie normochromique normocytaire
  - Pancytopénie
  - Polychromasie
  - Aplasie pure des globules blancs
  - Agglutination des globules rouges
  - Anémie falciforme avec crise
  - Splénomégalie
  - Hématome spontané
  - Thrombocytopénie
  - Purpura thrombocytopénique
  - Thrombocytose
  - Purpura thrombotique thrombotique

Nombre de cas individuels par groupe d'âge et sexe, groupe de rapporteurs et résultat



source : <https://pgibertie.com/>